

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Samedi

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 7 fr.
Etranger 10 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

ADMINISTRATION :

ORGES CARRÉ, ÉDITEUR
8 RUE RACINE, Paris

DIRECTION SCIENTIFIQUE

F. BRUN
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY
Professeur de thérapeutique,
Médecin de l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER
Professeur agrégé,
Médecin des hôpitaux.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur des hôpitaux.

M. LÉTULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

L. OLIVIER
Docteur ès sciences.

DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

M. LERMOYER
Médecin des hôpitaux.

Tout ce qui concerne la Rédaction doit être adressé à

M. LE D^r DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL

Les communications verbales sont reçues les lundi et vendredi

De 4 à 6 heures

8, RUE RACINE, Paris

SOMMAIRE

PURPURA, par le professeur Hayem	233
LES CÉRÉBRAUX MULTIPLES A PNEUMOQUES, ABCS DU POU MON, par L. Siron et Josué	235
NÉ HYPERTROPHIQUE, par MM. Berdal et Jayle	237
DECINE PRATIQUE. L'efficacité et l'hygiène es sanatoria pour tuberculeux	238
ALYSES DES TRAVAUX français et étrangers	238
ÉTÉS SAVANTES FRANÇAISFS	XCI
LIOGRAPHIE	XCI

FACULTÉ DE MÉDECINE

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Vendredi 26 juin 1895, à 1 heure. — **M. BARTOLI** : Quelques considérations sur les résultats du traitement méral dans la salpingite; **MM. Potain, Joffroy, Chauffard, Ucher.** — **M. BECART** : Considérations sur l'hémogloburie et les hémoglobinuries brightiques; **MM. Potain, Joffroy, Chauffard, Gaucher.** — **M. DUCROUX** : Contribution à l'étude de la neurasthénie. Rapports de la maladie Beare avec les maladies infectieuses; **MM. Potain, Joffroy, Chauffard, Gaucher.** — **M. KATZENELLENBOGEN** : s. lipomes symétriques; **MM. Straus, Grancher, Brisard, Tuffier.** — **M. WESSBERG** : La scrofule moderne mparée à la scrofule ancienne; **MM. Straus, Grancher, issaud, Tuffier.** — **M. HUBER** : Recherches physiologiques sur la résorption rénale; **MM. Straus, Grancher, issaud, Tuffier.** — **M. NEVEUX** : De la gangrène du méstin et de la gangrène pulmonaire consécutive; **MM. aus, Grancher, Brissaud, Tuffier.** — **M. COCAONE** : Du onostic dans la présentation du siège; **MM. Pinard, clus, Sébilleau, Varnier.** — **M. ABD EL NOUR** : Les mêts du tamponnement vaginal dans le placenta-prævia montrés par les statistiques récentes de ses partisans; **M. Pinard, Reclus, Sébilleau, Varnier.** — **M. JALLOR** : s. opérations conservatrices dans le traitement de stéio-sarcome; **MM. Pinard, Reclus, Sébilleau, Varnier.** — **M^{me} MAGNUS** : Etude clinique des tumeurs adénoïdes, ar traitement chirurgical. Résultats post-opératoires; **M. Terrier, Delens, Jalaguier, Lejars.** — **M. GOURDET** : ude sur l'aplatissement comparé du thorax par les différents procédés de résection costale, et spécialement r un nouveau procédé de thoraco-plastie; **MM. Terrier, elens, Jalaguier, Lejars.**

Jeudi 27 juin 1895, à 1 heure. — **M. MAIGNANT** : ontribution à l'étude des péricystites suppurées; **MM. uyon, Cornil, Humbert, Netter.** — **M. DUTOURNIER** : ontribution à l'étude du diabète bronzé; **MM. Cornil, Guyon, umbert, Netter.** — **M. DUCLOS** : Des complications osseuses provoquées par le bacille d'Eberth dans la fièvre phoïde; **MM. Cornil, Guyon, Humbert, Netter.**

M. MARMASSE : Du curettage dans les accidents des suites de couches; **MM. Tarnier, Le Dentu, Bouilly, Nélaton.** — **M. DUBOIS** : Contribution à l'étude de l'hypertrophie mannaire dans le cours de la grossesse; **MM. Tarnier, Le Dentu, Bouilly, Nélaton.** — **M. BARAU** : Des reproches faits à la cocaïne dans son emploi en chirurgie; **MM. Le Dentu, Tarnier, Bouilly, Nélaton.** — **M. ACARD** : Contribution à l'étude des cirrhoses pigmentaires; **MM. Debove, Joffroy, Marie, Menetrier.** — **M. MALHERBE** : Contribution à l'étude du mycosis fongioïde et spécialement des érythrodermies prémycosiques; **MM. Debove, Joffroy, Marie, Menetrier.** — **M. TRIGER** : Du phlegmon sous-muqueux. Gastrite phlegmoneuse; **MM. Debove, Joffroy, Marie, Menetrier.** — **M. LE MATTHE** : Des états cataleptiques dans les maladies mentales; **MM. Joffroy, Debove, Marie, Menetrier.**

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 24 juin 1895, à 9 heures. — 1^{re} (1^{re} série) : **MM. Baillon, Hanriot, Weiss.** — 1^{re} (2^e série) : **MM. Blanchard, Guebbard, Fauconnier.** — 2^e Sages-femmes 1^{re} cl. (Clin. Baudelocque). Nouveau régime : **MM. Pinard, Sébilleau, Varnier.**

A 1 heure. — 2^e Oral (Première partie, 1^{re} série) : **MM. Monod, Reclus, Retterer.** — 2^e Oral (Première partie, 2^e série) : **MM. Marchand, Delens, Poirier.** — 3^e Oral (Deuxième partie) : **MM. Potain, Fournier, Dejerine.** — 2^e Chirurgien-dentiste : **MM. Landouzy, Sébilleau, André.** — 5^e (Première partie, Chirurgie, Hôtel-Dieu, 1^{re} série) : **MM. Terrier, Jalaguier, Tuffier.** — 5^e (Première partie, Chirurgie, Hôtel-Dieu, 2^e série) : **MM. Tillaux, Delbet, Lejars.** — 5^e (Deuxième partie, Hôtel-Dieu) : **MM. Hayem, Brissaud, Gaucher.**

Mardi 25 juin 1895, à 1 heure. — 2^e Oral (Première partie) : **MM. Remy, Quénu, Poirier.** — 3^e Oral (Première partie) (1^{re} série) : **MM. Le Dentu, Pozzi, Albarran.** — 3^e Oral (Première partie, 2^e série) : **MM. Berger, Bouilly, Humbert.** — 4^e (1^{re} série) : **MM. Proust, Dieulafoy, Letulle.** — 4^e (2^e série) : **MM. Pouchet, Raymond, Marie.** — 5^e (Première partie, Chirurgie, Charité (1^{re} série) : **MM. Duplay, Schwartz, Brun.** — 5^e (Première partie, Chirurgie, Charité (2^e série) : **MM. Guyon, Polaillon, Nélaton.** — 5^e (Deuxième partie, Charité) : **MM. Jaccoud, Cornil, Ballet.** — 5^e (Première partie) Obstétrique, Clin. d'accouchement, rue d'Assas : **MM. Tarnier, Maygrier, Bar.**

Mercredi 26 juin 1895, à 9 heures. — 1^{re} (1^{re} série) : **MM. Lutz, Blanchard, André.** — 1^{re} (2^e série) : **MM. Hanriot, Guebbard, Heim.**

A 1 heure. — 2^e Chirurgien-dentiste : **MM. Cornil, Poirier, Netter.** — 5^e (Première partie, Chirurgie, Hôtel-Dieu) : **MM. Marchand, Monod, Ricard.** — 5^e (Deuxième partie, Hôtel-Dieu) : **MM. Hayem, Fournier, Dejerine.**

Jeudi 27 juin 1895, à 9 heures. — 2^e Sages-femmes 1^{re} cl. Clin. d'accouchements, rue d'Assas. Nouveau régime : **MM. Tarnier, Maygrier, Bar.**

A 1 heure. — 2^e Oral (Première partie) (1^{re} série) : **MM. Polaillon, Quénu, Chantemesse.** — 2^e Oral (Première partie, 2^e série) : **MM. Raymond, Remy, Poirier.** — 2^e Oral (Première partie, 3^e série) : **MM. Berger, Pozzi, Roger.** — 2^e (Deuxième partie) : **MM. Dieulafoy, Hallopeau, Charrin.** — 4^e : **MM. Grancher, Ballet, Gilbert.** — 2^e Chirurgien-dentiste : **MM. Duplay, Pouchet, Marchand.**

Vendredi 28 juin 1895, à 9 heures. — 1^{re} (1^{re} série) : **MM. Baillon, Guebbard, Fauconnier.** — 1^{re} (2^e série) : **MM. Lutz, Blanchard, Weiss.**

A 1 heure. — 2^e Oral (Première partie) : **MM. Monod, Retterer, Poirier.** — 4^e : **MM. Pouchet, Landouzy, Netter.** — 2^e Chirurgien-dentiste : **MM. Hayem, Gaucher, Sébilleau.** — 5^e (Première partie, Chirurgie, Charité (1^{re} série) : **MM. Tillaux, Reclus, Tuffier.** — 5^e (Première partie, Chirurgie, Charité (1^{re} série) : **MM. Delens, Delbet, Lejars.** — 5^e (Deuxième partie, Charité) : **MM. Potain, Straus, Chauffard.** — 5^e (Première partie, Obstétrique, Clinique Baudelocque) : **MM. Pinard, Marchand, Varnier.**

Samedi 29 juin 1895. — 2^e Oral (Première partie) : **MM. Remy, Quénu, Poirier.** — 2^e Chirurg.-dent (1^{re} série) : **MM. Pouchet, Berger, Gilbert.** — 5^e (Première partie, Chirurgie, Hôtel-Dieu (1^{re} série) : **MM. Panas, Polaillon, Nélaton.** — 5^e (Première partie, Chirurgie, Hôtel-Dieu (2^e série) : **MM. Le Dentu, Brun, Albarran.** — 5^e (Deuxième partie, Hôtel-Dieu) : **MM. Laboulbène, Chantemesse, Ballet.** — 5^e (Deuxième partie, Charité (1^{re} série) : **MM. Dieulafoy, Marfan, Ménétrier.** — 5^e (Deuxième partie, Charité (2^e série) : **MM. Raymond, Hallopeau, Letulle.** — 5^e (Première partie, Obstétrique Clin. d'accouchem. rue d'Assas : **MM. Tarnier, Maygrier, Bar.**

Concours d'agrégation (anatomie, physiologie, histoire naturelle). — Ont traité les questions suivantes : Epreuve de une heure après quarante-huit heures de préparation :

17 juin. — **M. G. Galavielle** (Montpellier) : *Les insectes vésicants, explication de leurs hypermétamorphoses*; **M. Gerbert** (Bordeaux, Montpellier, Nancy) : *Production de lumière chez les animaux.*

18 juin. — **M. Reille** (Bordeaux) : *Anatomie comparée de l'appareil néphridien chez les vertébrés*; **M. Peytoureau** (Bordeaux) : *L'appareil électrique des poissons.*

19 juin. — **M. Thierry** : *Les systèmes portes.*

20 juin. — **M. Vignic** (Bordeaux, Nancy, Montpellier) : *Le corps thyroïde*; **M. Mouret** (Montpellier) : *Les dérivés branchiaux.*

21 juin. — **M. Jacques** (Nancy) : *La glande mammaire*; **M. Soulié** (Toulouse) : *Le neurome, d'après les conceptions récentes.*

22 juin. — **M. Ambialet** (Toulouse) : *Des modes de communication des vaisseaux sanguins*; **M. Durand** (Lyon) : *L'ectoderme et ses dérivés.*

Stage hospitalier. — Le classement des stagiaires pour les mois de décembre 1895, janvier et février 1896, aura lieu les 4, 5 et 7 novembre 1895, de 9 à 11 heures du matin, dans le petit amphithéâtre de la Faculté.

Seront inscrits d'office sur la liste des stagiaires, **MM. les étudiants** dont la scolarité sera soumise au stage au cours de l'année scolaire 1895-1896, et qui auront pris l'inscription de juillet 1895 à la Faculté de médecine de Paris (8^e ou 12^e).

Sont invités à demander, par écrit, leur inscription sur la liste des stagiaires, et avant le 1^{er} novembre 1895, **MM. les étudiants**, soumis au stage, qui n'auraient pas pris l'inscription de juillet 1895 (8^e ou 12^e), ou qui auraient pris cette inscription dans une Faculté ou Ecole des départements.

MM. les étudiants qui seront appelés sous les drapeaux en novembre 1895 sont priés d'en informer le doyen, par écrit, avant le 1^{er} novembre 1895.

Une lettre de convocation individuelle sera adressée à chaque stagiaire. (Faire connaître les changements d'adresse, s'il y a lieu.)

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES

25, rue du Quatre-Septembre, Paris.

Installations Téléphoniques
Câbles et fils isolés
Pneumatiques de Vélocipèdes

Cauchoouc et Gutta-percha
pour usages médicaux
Vêtements Imperméables

Phosphore de chaux Freyssinge.

KOLA CHAPOTOT GRANULÉE

AMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

TROISIÈME ANNÉE. — N° 30.

VICHY-CÉLESTINS

Dyspepsies : Vin de Chassaing.

Aliment des enfants : Phosphatine Falières.

Constipation : Poudre laxative de Vichy.

Herpétisme : GRANULES DE FOWLER.

Atonie de l'estomac : GRANULES DE BAUME.

MÉTRITES : PÉRICOLS

Hygiène de la Bouche et Conservation des Dents

DENTIFRICE ANTISEPTIQUE BOBŒUF

Société du Phénol-Bobœuf, 22, Boul. Poissonnière, Paris.

DEPUIS

QUATRE SIÈCLES : **POUGUES**

est le souverain remède des Affections de l'Estomac.

CHARBON NAPHTOLÉ **FRAUDIN** granulé

Marque déposée

Préparations pharmaceutiques spécialisées de Gaïacol Alpha
Cristallisé synthétique et de Créosote Alpha synthétique titrée

Marque déposée

PERLES DE GAÏACOL CLERTAN

Chaque perle contient dix centigrammes de Gaïacol Alpha cristallisé synthétique
DOSE MOYENNE : 2 à 4 par jour.

PARIS, 19, rue Jacob. — Maison L. FRÈRE. — A. CHAMPIGNY et C^{ie}, Succ^{rs}
ET DANS LA PLUPART DES PHARMACIES DE TOUTS LES PAYS

SIROP DE CRESSON
Iodophosphaté
de **H. MAYAUD**
Lymphatisme, Anémie, Aménorrhée, Affections pulmonaires

Une cuillerée à bouche contient 0 gr. 03 d'Iode et 0 gr. 25 de phosphate de chaux
ENFANTS : 1 cuillerée à café. — ADULTES : 1 cuillerée à bouche (matin et soir)

LE MEILLEUR MOYEN D'ADMINISTRER L'IODE
Remplace avantageusement l'Huile de Foie de Morue.

Envoi d'échantillons pour la France. F. PROST, Ph^{en} 38, r. Keller, Paris.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant et antiscrofuleux**; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les affections chancreuses et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIODOFORME TAINÉ**
Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 9, Rue de la Perle, Paris.

PHOSPHOVINATE D'OR JOLLY Reconstituant et Sé des CELLULES NERVE par l'ACIDE PHOSPHORIQUE, stimulant et anti-diathésique par
Spécifique **MALADIES NERVEUSES** ET DU **DIABÈTE**
réel des
DOSES : 10 à 80 gouttes par jour en 2 fois progressivement.
PARIS, 64, Faubourg Poissonnière

Granules de Catillon 2 à 4 par jour produisent une diurèse rapide relèvent le cœur affaibli, dissipent
A 1 MILLIGR. D'EXTRAIT TITRE DE
STROPHANTUS
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, CÉDÈME
Usage continu sans inconvénient ni intolérance.
EXIGER LA MARQUE. Paris, 3, Boul'S-Martin.

CONTRE
Maux de gorge, Aphtes,
Extinction de voix, Angine, etc.

GARGARISME SEC
du D^r WILLIAMS
Ce Bonbon composé d'Extrait de mures et de roses rouges renferme 0,05 de Bi-Borate de Soude et 0,001 de Chlorhydrate de Cocaine pur. — Il présente sur les gargarismes liquides l'immense avantage : 1° d'être très portatif et par conséquent pouvoir être utilisé à tout moment et en tous lieux ; 2° de rester plus longtemps en contact avec les parties malades et de teindre plus avant dans la gorge. Il tonifie les muqueuses, déterge les parties excoriées et calme les inflammations existantes.

UTILITÉ
aux Orateurs, Prédicateurs, Chanteurs, Conférenciers

DÉPOT : PHARMACIE NORMALE : 19, Rue Drouot, PARIS.

CÉRÉBRINE Coca-Théine Analgésique Pausodun.

MIGRAINES * NÉURALGIES
Vertige stomacal, Zona, Lumbago, Courbature, Influenza, COLIQUES MÉNSTRUÉLLES
C. BROMÉE et C. IODÉE : Neurasthénie, Névroses, Névralgies rebelles, Rhumatismes, etc.
Une c. à souper à toute période de l'accès. Flac. : 5 fr. et 3 fr.
E. FOURNIER, 114, Rue de Provence, et l^{re} Pharm.

NÉVROSES
SIROP COLLAS
BROMURE double de POTASSIUM et de LITHIUM
DOSE : 2 ou 3 CUILLERÉES PAR JOUR.
Le Bromure de Lithium est le plus puissant de tous les sédatifs dans le traitement des maladies nerveuses, car ce Bromure contient 1,95 de Brome pour cent parties.
Ph^{ie} COLLAS, 8, rue Dauphine, PARIS

Remède souverain
CONTRE LA
MALARIA
ET
CONTRE TOUTES LES
Fièvres Coloniales
CHLORHYDRATE DE PHÉNOCCOLLE
DANS TOUTES LES PHARMACIES.
Doses suivant indication médicale.

ANTIPYRINE
Du Docteur KNORR, fabriquée à Crail (Oise)
Seul spécifique certain des migraines et névralgies expérimenté et approuvé par les médecins du monde entier.
EXIGER TOUTES PHARMACIES LA MARQUE
ANTIPYRINE du D^r KNORR
consulter les médecins pour les doses à prendre.

NÉURALGIES MIGRAINES. — Guérison
immédiate
par les Pilules Antinévralgiques du D^r CRONIER
Boîte : 3 fr. (envoi P^o). — Ph^{ie} 23, Rue de la Monnaie, Paris.

Adopté officiellement par les Hôpitaux de la Marine et des Colonies
FER BROMOPEPSIQUE
Du D^r Marnata - TONIQUE, DIGESTIF, ANTINERVEUX
Elixir : Un verre à liqueur pour les adultes, une cuillerée à dessert pour les enfants.
Dragées : Six par jour. — Envoi franco échantillon. GIRAND, 217, rue Lafayette, Paris

ÉLIXIR Dans les cas de **CHLOROSE** et d'**ANÉMIE** rebelles aux Moyens Thérapeutiques ordinaires

Préparation nouvelle, liqueur très agréable à prendre par petit verre après chaque repas.

HEMOGLOBINE
SOLUBLE DE V. DESCHIENS

Les préparations à base d'
VIN
Un verre à madère immédiatement avant ou après chaque repas, un petit verre à liqueur pour les enfants.

PRINCIPE FERRUGINEUX NATUREL * RÉPARATEUR DES GLOBULES DU SANG
ont toujours donné
Les RÉSULTATS les PLUS SATISFAISANTS
Sans fatiguer l'estomac, sans amener la constipation, sans altérer les dents.

SIROP
Une cuillerée à soupe immédiatement avant ou après le repas, soit pur, soit dans un quart de verre d'eau ordinaire ou gazeuse.

expérimentées dans les hôpitaux

DRAGÉES
3 à 6 par jour.
VENTE EN GROS :
Maison ADRIAN & C^{ie}
à PARIS, 9, et 11, Rue de la Perle.

Ainsi qu'il résulte de nombreuses expériences faites dans les Hôpitaux les
CAPSULES SÉRAFON
dans les **BROVCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**
La DILATATION des BRONCHES et la BRONCHORRÉE amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

GAÏACOL IODOFORME SÉRAFON

PHTISIE, TUBERCULOSE PULMONAIRE
ET
PLEURÉSIE
D'ORIGINE TUBERCULEUSE
Les SOLUTIONS SÉRAFON
en injections hypodermiques arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la guérison au 1^{er} et au 2^{me} degré (une instruction pour la pratique de ces injections accompagne chaque flacon). Pharmacie SÉRAFON à Bordeaux et toutes pharmacies.
PRÉPARATION et VENTE en GROS : Société Française ADRIAN & C^{ie}, 9 et 11, rue de la Perle, Paris.

GAÏACOL EUCALYPTOL SÉRAFON

Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles. — Les examens pour le certificat d'Etudes physiques, chimiques et naturelles, s'ouvriront lundi prochain, 24 juin.

1-30 juin : travaux pratiques.

Oral commencera le 5 juillet.

Professeurs chargés des cours et les chefs de travaux pratiques.

HOPITAUX

Concours pour le clinicat.

Les jurys des divers concours de cliniciens sont composés comme il suit :

Clinicat médical. — MM. Jaccoud, Potain, Dieulafoy, Debove, Landouzy.

Clinicat des maladies du système nerveux. — MM. Jaccoud, Potain, Dieulafoy, Debove, Landouzy, Raymond.

Clinicat chirurgical et des maladies des voies urinaires. — MM. Duplay, Tillaux, Berger, Guyon, Terrier.

Clinicat obstétrical. — MM. Duplay, Tillaux, Berger, Guyon, Terrier, Tarnier, Pinard.

Clinicat ophtalmologique. — MM. Panas, Le Dentu, Terrier, Gley.

NOUVELLES

Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences. — Le prochain Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences doit réunir à Bordeaux du 4 au 9 août 1895.

Comment déterminer et fixer le type de la nutrition normale.

Comment différencier la nutrition normale de la nutrition ou des nutriments pathologiques?

Programme du Congrès : Dimanche 4 août : Séance d'ouverture.

Lundi, mardi, 5 et 6 août : Séances de sections, visites industrielles, conférence.

Mercredi 7 août : Excursion générale à Royan, Atlantique.

Vendredi 8 août : Séances de sections, visites industrielles.

Samedi 9 août : Séances de sections et séance de clôture.

Samedi 10 août : Excursion à Arcachon, Dax, jointe à l'excursion finale (dimanche à mercredi, 11 au 14 août) à Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Fontvieille, Saint-Sébastien, Bilbao.

SOCIÉTÉS SAVANTES

ACADÉMIE DES SCIENCES

du 10 juin 1895.

Causes de la coloration et de la coagulation du lait par la chaleur. — MM. Cazeneuve et Haddon.

Le lait à l'air pendant un certain temps se colore en jaune et se coagule. A l'ébullition, puis à 110 degrés et, plus forte raison, à 130 degrés, le lait se coagule et prend une couleur caramel.

La coagulation se fait dès que la coloration jaune a atteint une certaine intensité.

Nous avons institué une série d'expériences pour reconnaître la cause de la coloration et de la coagulation. Les résultats que nous avons obtenus nous permettent de formuler les conclusions suivantes :

1^o Le jaunissement du lait par la chaleur est dû à l'oxydation de la lactose en présence des sels alcalins du lait.

2^o La lactose, dans cette oxydation, donne des acides, entre autres de l'acide formique facile à constater, dont la présence suffit à expliquer la coagulation du lait, même il arrive avec n'importe quel acide.

3^o La caséine coagulée n'est pas altérée dans ces conditions, mais simplement teinte en jaune par les corps ainsi formés aux dépens de la lactose.

17 juin 1895.

Production expérimentale d'un lymphadénome angioneurale généralisé chez un chien. —

Pierre Delbet. J'ai pu reproduire le lymphadénome par l'inoculation de cultures pures d'un bacille trouvé dans le sang de la rate, chez une femme atteinte elle-même de lymphadénome généralisé à forme surtout splénique. Cette femme ayant succombé aux progrès de la cachexie, j'ai constaté qu'il s'agissait bien de lymphadénome.

C'est sur le chien que j'ai reproduit expérimentalement le lymphadénome. Des inoculations de cultures pures ont été faites à doses massives et répétées.

Le chien que j'ai sacrifié a été la première fois inoculé le 16 mai, la seconde le 18, dans le péritoine et le tissu cellulaire. D'autres inoculations ont été faites à des intervalles variables.

L'animal a perdu, en quinze jours, 2 kilogrammes, c'est-à-dire plus du cinquième de son poids. Deux fois il est produit des abcès au siège de l'inoculation; ces abcès, qui ont guéri avec une extrême facilité, contenaient le même bacille à l'état de pureté.

Le 15 juin le chien a été sacrifié. Les ganglions du péricard, du mésocolon, les ganglions thoraciques et

prévertébraux, ceux de l'aîne droite et des deux aisselles étaient considérablement hypertrophiés.

Des cultures faites avec les ganglions ont montré, à l'état de pureté, le bacille inoculé.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

18 juin 1895.

Par suite de la mort de M. Verneuil la séance est levée en signe de deuil.

Liste de présentation des candidats au titre de membre titulaire.

(Physique et chimie médicales) : 1^{re} ligne, M. Regnard; 2^e ligne, M. Pouchet; 3^e ligne (ex æquo) : MM. André, Burcker, Weiss.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

15 juin 1895.

Mouvements automatiques chez les animaux décapités. — M. Tarchanoff. Après avoir sectionné la moelle au niveau de la quatrième vertèbre cervicale chez un canard et établi la respiration artificielle, si on pose une ligature en masse sur le cou, et qu'on décapite l'animal, on constate des mouvements automatiques spontanés des ailes et du corps. Ces mouvements peuvent durer quelques heures, cessent par moments et réapparaissent spontanément sans aucune excitation extérieure. Sur l'eau, le canard se met à nager, s'efforce de voler et, dans tous ces mouvements, se déplace comme dans l'intégrité de ses fonctions sans jamais perdre l'équilibre. Il faut donc que la moelle possède un centre de l'équilibre, différent du centre cérébral.

Si l'on touche l'animal au repos, il se met en mouvement; l'excite-t-on lorsqu'il est en mouvement, il revient au repos. Quand l'excitabilité est très grande, il est possible d'arrêter les mouvements du canard décapité par un cri, un bruit sec. La surface de section de la moelle doit être l'origine de l'excitabilité; en effet, si l'animal est décapité, non par section, mais par ligature progressive du cou jusqu'à ce que la tête tombe flasque, il ne présente aucun mouvement spontané, mais si on l'excite, il a des mouvements réflexes intenses.

Sur la répartition des fibres endogènes du cordon postérieur de la moelle et la constitution du cordon de Goll. — MM. J. Déjerine et J. Sottas. De l'étude de trois cas de lésions transverses de la moelle, il résulte que le cordon de Goll ne reçoit ni collatérales descendantes radiculaires, ni fibres endogènes. Les collatérales descendantes restent dans le cordon de Burdach; quant aux fibres endogènes, elles occupent la zone voisine du col de la corne postérieure dans toute la hauteur de la moelle, la zone médiane à la région lombaire alors que le cordon de Goll n'est pas encore constitué, et la partie interne du cordon de Burdach dans les régions dorsale et cervicale de la moelle.

Il semble donc que le cordon de Goll est un faisceau fermé, c'est-à-dire qu'une fois constitué à la partie supérieure de la région lombaire, il continue bien à s'accroître par l'adjonction successive de nouvelles fibres et émet aussi des fibres, mais il ne reçoit pas de fibres étrangères. Les différents groupes de fibres longues radiculaires une fois classés dans le cordon de Goll ne se mêlent pas aux fibres radiculaires qui s'y ajoutent plus haut et le cordon de Goll ne reçoit aucune fibre d'origine spinale.

Pleurésie à proteus; influence de la grossesse sur l'infection; influence de l'infection sur les nouveau-nés. — M. Charrin. Chez une femme enceinte de sept mois et demi, j'ai observé, avec M. Nobécourt, une pleurésie gauche s'accompagnant d'une dyspnée intense, d'un état général grave. Les signes physiques permettaient de supposer que le liquide était peu abondant, fait qui a été vérifié par une ponction. Le liquide était purulent, d'une odeur fade, nauséuse, fétide; il contenait des gaz; il renfermait aussi un bacille répondant, de par les cultures, de par les inoculations, au *proteus vulgaris*.

Cette ponction n'a procuré qu'un soulagement minime à la malade; en dépit des antiseptiques, le mal a empiré; l'avortement s'est produit, suivi, au bout de quelques heures, de la mort, qui est survenue le dix-septième jour de l'affection.

Cette observation présente plus d'un côté intéressant. Et, d'abord, en la rapprochant de plusieurs cas plus ou moins récents, montrant que ce microbe peut causer des entérites, des icères, etc., elle contribue à établir que ce *proteus* est capable d'engendrer des lésions disparates, de se comporter comme le bacille du colon, le streptocoque, etc.

En second lieu, en dehors de la grossesse, en dehors de la nature de ce germe, l'autopsie pas plus que les antécédents n'ayant révélé aucune autre donnée propre à expliquer ce caractère de gravité au cours d'une pleurésie de volume médiocre, ce fait met en lumière, pour faire comprendre cette gravité, l'association de deux facteurs : d'une part, l'affaiblissement du terrain causé ici par la puerpéralité, d'autre part, l'espèce bactérienne, une bactérie génératrice de poisons putrides très toxiques.

En troisième lieu, l'enfant est vivant; mais, bien qu'il prenne régulièrement le sein, bien qu'il n'offre aucune tare grossière apparente, son poids, qui était à la naissance de 2,450 grammes, est descendu, vingt-neuf jours après, à 2,300 grammes.

On peut invoquer l'arrivée avant terme; toutefois, ces rejets du septième, du huitième mois, assez fréquemment, augmentent de poids d'une façon régulière. D'ailleurs, à cet égard, nous pouvons citer un cas de même ordre à propos d'un autre nouveau-né, dont la mère, durant les dernières journées, a eu un vaste phlegmon; ce nouveau-né, qui a actuellement cinq semaines, n'a pris en moyenne que 9 grammes par vingt-quatre heures. Des enfants issus de tuberculeuses, ne présentant eux-mêmes aucune lésion bacillaire visible, nous permettraient de fournir d'autres arguments.

Le groupement de ces faits conduirait à rassembler une série de notions positives qui apprendront en quoi consiste, en matière de croissance, etc., cette hérédité indirecte, cette hérédité du terrain. Il est probable que l'intoxication du fœtus par les toxines franchissant le placenta entre en ligne de compte.

Ces tares héréditaires, conséquences d'une venue avant terme, d'un empoisonnement, etc., accroissent l'intensité des maladies; c'est ainsi que récemment nous avons vu le staphylocoque seul provoquer, chez un enfant de sept mois, une gangrène cutanée considérable.

On voit, en somme, que la puerpéralité, que la débilité native influencent l'infection; on voit également que l'infection exerce son action sur le produit de la conception, amenant la formation d'un être dont les premiers éléments anatomiques s'édifient avec peine.

Pouvoir antitoxique des capsules surrénales. — M. Abelous. De quelques expériences pratiquées sur la grenouille je peux conclure que les capsules surrénales ont un pouvoir antitoxique manifeste. C'est ainsi, par exemple, qu'une grenouille sans foie ni capsules résiste moins à l'action du sulfate d'atropine qu'une autre privée seulement du foie.

Ces faits joints à ceux de MM. Charrin et Langlois, semblent bien établir le pouvoir antitoxique des capsules surrénales.

Effets de la chloroformisation sur les grenouilles. — M. Tarchanoff. La chloroformisation détermine chez les grenouilles divers phénomènes hallucinatoires et des troubles mentaux très particuliers. C'est ainsi qu'on voit l'animal prendre des attitudes bizarres, exécuter des mouvements, par exemple, comme pour attraper des insectes, se précipiter au moindre bruit du côté où son attention est attirée, etc.

SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

19 juin 1895.

Hystérectomie abdominale pour fibromes. — M. Lucas-Championnière. De la discussion qui vient d'avoir lieu se dégage très nettement cette notion générale que les chirurgiens tendent de plus en plus à abandonner les procédés avec pédicule.

Pour ma part, je me suis rangé au procédé de Doyen, après l'avoir vu exécuter par l'auteur lui-même. J'ai pratiqué huit interventions et j'ai eu deux morts, mais il faut ajouter que je n'ai opéré que des cas très graves, dont l'un en particulier était compliqué de double salpingo-ovarite suppurée et dont deux autres s'accompagnaient d'albuminurie légère. J'ai été frappé de la simplicité des suites qui ne ressemblent en rien à celles que me donnait le pédicule externe.

Le seul point sur lequel j'insiste en terminant, c'est que je ne pratique pas le curetage préalable de la cavité utérine; je ne le crois pas nécessaire et je pense même que ce prétendu nettoyage est le plus souvent illusoire.

Ethérisation. — M. Delorme. De l'étude des statistiques des anesthésies en chirurgie de guerre et de tout ce que nous savons par l'emploi de l'éther anesthésique, je tire les conclusions suivantes :

La rapidité et l'intensité plus grandes de l'action du chloroforme avec des quantités moindres d'anesthésique, sa conservation plus facile, la généralisation de son emploi sans qu'on ait à tenir compte et de l'âge des opérés et du siège de l'opération et du mode d'administration (cornet spécial), tous ces avantages, en un mot, semblent trop précieux pour ne pas accorder au chloroforme une supériorité marquée sur l'éther dans la pratique de la chirurgie de guerre. Si ses dangers sont peut-être, et dans une proportion en tous cas minime, plus réels, une attention, une surveillance minutieuse les atténueront ou les éviteront.

Dans la pratique usuelle je reste attaché au chloroforme qui ne m'a jamais donné de mort, mais seulement des alertes liées surtout au mode d'administration.

J'insiste encore sur un point : c'est l'extrême facilité avec laquelle les soldats blessés sur les champs de bataille prennent le chloroforme.

M. Ollier. Bien que je sois partisan convaincu de l'éther, je me range volontiers aux conclusions de M. Delorme en ce qui concerne l'emploi du chloroforme dans la chirurgie de guerre. L'éther est en effet trop encombrant pour que l'approvisionnement en soit aisé. Quant à ce qui est de son administration, comme M. De-

LES CAPSULES SÉRAFON

amènent la Guérison, dessèchent les Bronches, font disparaître la fétidité des Crachats
Dans les BRONCHITES aiguës et chroniques, la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée

ANTISEPSIE  PULMONAIRE

SOLUTION SÉRAFON DE GAIACOL IODOFORMÉ

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Un centimètre cube de cette solution contient exactement :
1 centigramme d'iodoforme.
5 — de gaiacol absolu.

Prix : 6 francs.

Ph^{ie} SÉRAFON Bordeaux, et dans toutes les Pharmacies.
VENTE EN GROS :
Société Française de Produits Pharmaceutiques
9 et 11, Rue de la Perle, PARIS.
Exiger sur chaque flacon, la Marque de garantie de dépôt.

CAPSULES SÉRAFON
EUCALYPTOL & GAIACOL
IODOFORMÉS

Souveraines dans la bronchite aiguë ou chronique, la bronchorée, la tuberculose; arrêtent l'hémoptysie et les vomissements de la phthisie; diminuent la toux et l'expectoration, cicatrisant les lésions.

Dose : 4 à 6 capsules par jour.
Prix : 5 fr. la Boîte.

AVIS.— Ces préparations, les premières expérimentées avec succès dans les Hôpitaux, contiennent le Gaiacol cristallisé, l'Iodoforme et l'Eucalyptol à l'état de pureté absolue. La fabrication et l'exploitation en ont été confiées à la Maison ADRIAN & C^{ie}, 9 et 11, rue de la Perle, Paris.

ANTISEPSIE  PULMONAIRE

CAPSULES SÉRAFON DE GAIACOL IODOFORMÉ

ANTISEPSIE  PULMONAIRE

SOLUTION SÉRAFON EUCALYPTOL & GAIACOL IODOFORMÉS

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Un centimètre cube de cette solution contient :
1 centigramme d'iodoforme.
5 — de gaiacol absolu.
15 — d'eucalyptol.

Prix : 6 francs.

Ph^{ie} SÉRAFON Bordeaux, et dans toutes les Pharmacies.
VENTE EN GROS :
Société Française de Produits Pharmaceutiques
9 et 11, Rue de la Perle, PARIS.
Exiger sur chaque flacon, la Marque de garantie de dépôt.

LES SOLUTIONS SÉRAFON

en injections hypodermiques arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1^{er} et 2^e deg.
Dans la TUBERCULOSE PULMONAIRE et les PLEURÉSIES d'origine tuberculeuse

GRANULÉS EFFERVESCENTS de **CHLORALOSE BAIN**
HYPOPTIQUE NOUVEAU (Formule HANRIOT et Ch. RICHET)
B. BAIN & FOURNIER, seuls Préparateurs, 43, Rue d'Amsterdam, Paris.

DEPTO-SANTAL Préparation obtenue par digestion pancréatique, pouvant seule être absorbée à haute dose, la meilleure et la plus active contre les **MALADIES des VOIES URINAIRES.**
Dose : de 6 à 18 Capsules (de 0.20) par jour.
Phar^{ie} VICARIO, 13, B^e Haussmann (près la rue Talbott), Paris.

L'APIOL DES D^{rs} JORET & HOMOLLE régularise les ÉPOQUES.

Débilité nerveuse, Rachitisme, Neurasthénie

Glycérophosphate DE CHAUX FREYSSINGE

Solution contenant 0.50 de Glycérophosphate de Chaux chimiquement pur par cuillerée à soupe. Dose moyenne : 1 cuillerée à soupe avant chaque repas, dans un peu d'eau. Pour les enfants : une cuillerée à dessert ou à café suivant l'âge. — Le Flacon, 3 fr.
105, rue de Rennes, Paris, et les principales Pharmacies

SANTAL SALOLE LACROIX

4 à 8 capsules par jour. — AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES
76, RUE DU CHATEAU-D'EAU, PARIS, ET TOUTES LES PHARMACIES.

Le SACCHAROLÉ de QUINQUINA VIGIER

contient tous les principes actifs de l'écorce et remplace avantageusement les autres préparations de ce médicament. 3'.
VIGIER, Pharmacien, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS.

CARBONATE de GAIACOL VIGIER

en CAPSULES de 0.10 cent. — Dose : 3 à 6 capsules par jour.
Ph^{ie} VIGIER, 12, B^e BONNE-NOUVELLE, PARIS, et toutes Pharmacies.

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut de France. — Prix de Thérapeutique.

Les études comparatives faites dans les Hôpitaux ont démontré que les Dragées de Fer Rabuteau régénèrent les globules rouges du sang, avec une rapidité qui n'a jamais été observée en employant les autres ferrugineux : 4 à 6 Dragées chaque jour.

Élixir de Fer Rabuteau, recommandé aux personnes qui ne peuvent pas avaler les Dragées : Un verre à liqueur matin et soir aux repas.

Sirop de Fer Rabuteau, spécialement destiné aux enfants.

La médication martiale par le Fer Rabuteau est la plus rationnelle de la thérapeutique : Ni constipation, ni diarrhée, assimilation complète.

Prescrire le Véritable Fer Rabuteau de la Maison CLIN & C^{ie}, Paris.

NÉVRALGIES

Pilules du Dr Moussette

Chaque Pilule Moussette, Un cinquième de milligramme Aconitine cristallisée exactement dosée, contient : Cinq centigrammes Quinquin pur.

Les Véritables Pilules Moussette calment ou guérissent la Migraine, la Sciatique et les Névralgies les plus rebelles.

L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin par l'intermédiaire des nerfs vaso-moteurs, indique leur emploi dans les Névralgies du trijumeau, les Névralgies congestives, les affections Rhumatismales douloureuses et inflammatoires.

Prescrire les Véritables Pilules Moussette de la Maison CLIN & C^{ie}.

DIGESTIF du D^r CLIN

A base de Pepsine et de Pancréatine.

Le Digestif Clin convient aux dyspeptiques par atonie des organes et par insuffisance de sécrétions gastrique et intestinale. Il est le complément du régime animal conseillé par nos Maîtres à ces malades. Il s'adresse à la dyspepsie redoutable des chloro-anémiques, des convalescents, des débilés tombés dans le marasme, par suite d'appétence prolongée avec diarrhée ou constipation opiniâtre. Les ferments de ce Digestif peuvent simultanément digérer les graisses, l'albumine, la viande, les féculents.

DOSE : 1 VERRE À LIQUEUR À CHAQUE REPAS.

Prescrire le Véritable Digestif du Docteur CLIN.

Maison CLIN & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

orme, j'ai été frappé, en 1870, de la facilité avec laquelle les soldats se soumettent au chloroforme : je n'ai pas constaté alors d'accidents ni d'alerte, comme dans la pratique civile ordinaire.

M. Le Dentu. Je partage les idées de MM. Delorme et Ollier en ce qui concerne l'emploi du chloroforme en temps de guerre; la plus grande facilité de son approvisionnement, son innocuité remarquable en pareille circonstance le rendent incontestablement supérieur à l'éther.

Depuis plusieurs mois j'emploie à l'hôpital ce dernier anesthésique; j'en trouve l'administration plus facile, plus simple et plus rapide. Les vomissements me paraissent de moins longue durée qu'avec le chloroforme. Quant à l'irritation bronchique, elle existe certainement, mais je me demande si le chloroforme n'est pas aussi irritant et si l'on ne voit pas autant de complications pulmonaires avec celui-ci qu'avec celui-là.

M. Ollier. L'éther ne donne pas la moindre complication bronchique par lui-même et ce n'est pas à lui qu'il faut rattacher les complications pulmonaires observées. Bien au contraire, dans certains cas, j'ai vu très manifestement disparaître la toux après son administration.

M. Lucas-Championnière. L'irritation des bronches a pourtant été admise par les éthérisateurs les plus convaincus et M. Poncet lui-même rejette, pour cette raison, l'éther chez les vieillards. Pour ma part, elle ne me paraît pas douteuse et je me demande si pour éviter la mort brusque que peut donner le chloroforme, on ne s'expose pas à une mort plus éloignée par suite de complications pulmonaires.

M. Ollier. Je donne le chloroforme aux vieillards et, à mon sens, les accidents observés ne tiennent qu'au mode d'administration. Depuis deux ans, à la suite d'une vive alerte que me donna le chloroforme chez un enfant, j'endors également les enfants avec l'éther.

M. Poncet. Dans ma communication (v. *Presse médicale*, 1^{er} juin 1895, p. LXXIX) j'ai dit que je ne donnais pas d'éther aux vieillards, mais j'ai fait observer en même temps que les accidents observés pouvaient bien plutôt tenir aux conditions dans lesquelles se trouve le malade et qui l'exposent au refroidissement, qu'à l'anesthésique lui-même. Il y a deux jours, par exemple, une malade ayant été chloroformée, est morte à l'Hôtel-Dieu : nul doute que si l'éther eût été administré, on l'eût accusé d'avoir déterminé la mort.

Anus contre nature sur l'intestin grêle; entérectomie et entérorrhaphie par le bouton de Murphy. — M. Lejars lit une observation d'anus contre nature, dont il a fait la cure par l'entérectomie et l'entérorrhaphie avec le bouton de Murphy.

Sterilisation des éponges. — M. Michaux présente des éponges stérilisées par des vapeurs d'alcool à 125 degrés, sous pression. Ce mode de stérilisation donne d'excellents résultats.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

14 juin 1895.

Vaporisations dans le traitement de la diphtérie laryngée. — M. Comby, M. Variot a préconisé à la dernière séance les vaporisations, d'autres recommandent les inhalations; quelques-uns ont eu recours aux pulvérisations à vapeur. Ce dernier procédé me paraît très efficace et très pratique. L'indication des pulvérisations à vapeur s'étend à toutes les manifestations aiguës des premières voies aux inflammations nasales, buccales, pharyngées, laryngées et trachéales. Je viens précisément de traiter avec succès une enfant de quatre ans, atteinte de diphtérie naso-pharyngée avec tirage sus-sternal et abdominal.

Cirrhose alcoolique avec hématomésès successivement rouges et noirs. Mort par rupture de varices œsophagiennes. Péritonite chronique. — M. Hanot. Un homme de cinquante-sept ans, entré à l'hôpital le 29 avril 1895, vomissait parfois du sang noir, mélangé à du liquide pituiteux, le tout ayant l'aspect de la suite délayée et parfois du sang rouge foncé : le premier liquide donnait au papier tournesol une réaction acide, le second une réaction neutre ou légèrement alcaline. Il faut supposer que le sang était rejeté au dehors, tantôt directement, tantôt après avoir séjourné dans l'estomac. L'autopsie montra que ces hémorragies tenaient à la rupture d'une varice œsophagienne.

On trouva encore une péritonite chronique généralisée avec épaississement considérable du feuillet pariétal du péritoine sur lequel se voyaient des plaques laiteuses, absolument comparables à celles d'une péricardite chronique ou de la périplérite.

Rôle du système nerveux dans la production de l'hémoglobinurie paroxystique à frigore. — M. A. Chauffard. J'ai observé, il y a deux ans, un cas typique d'hémoglobinurie paroxystique à frigore, chez un ancien paludéen. L'expérience de Ehrlich m'a donné chez lui quelques résultats intéressants.

J'ai prélevé dans l'une des veines dorsales de chacune des deux mains un échantillon de 5 centimètres cubes de sang, mais l'une des mains est restée à l'air libre, et l'autre, fortement ligaturée au poignet, fut maintenue un quart d'heure dans de l'eau glacée.

Le sang veineux refroidi est rouge de coloration artérielle, ce qui était dû à l'arrêt des échanges interstitiels, comme l'a montré une contre-épreuve faite sur un sujet sain. L'autre sang était noirâtre, comme d'habitude.

Les deux échantillons de sang se sont coagulés de même, et, au bout de quarante-huit heures, il n'y avait de redissolution du caillot ni dans l'un, ni dans l'autre tube.

Le sérum du sang refroidi était rose cerise; le sérum de l'autre tube était citrin.

On sait que, d'après M. Hayem, le caillot du sang pris pendant la crise se redissout. Si cette redissolution n'a pas eu lieu ici, avec du sang purement refroidi, c'est que le refroidissement direct du sang n'explique pas, à lui seul, l'hémoglobinurie, ne réalise pas la totalité de la lésion sanguine. Il faut faire intervenir le système nerveux. Chez un sujet prédisposé, par l'infection la plupart du temps, la réaction nerveuse précède et commande la toxémie.

La preuve en est que, chez notre malade, la réfrigération intense d'une partie du corps limitée, la main, et isolée par une ligature, a provoqué tous les prodromes d'une crise générale, avec albuminurie prémonitoire.

J'ignore complètement comment, et par l'intermédiaire de quels organes ou tissus, agit ce réflexe nerveux; mais la réaction nerveuse paraît bien être l'acte initial qui met en branle le processus chimique, encore mal connu, de la crise hémoglobinurique.

Sur un procédé histologique modifiant la méthode de Pal. — M. Ballet expose à la Société un procédé qui modifie légèrement le procédé de Pal, surtout en en diminuant la longueur.

BIBLIOGRAPHIE

Dr Max Braun, professeur à l'Université de Königsberg. — *Die tierischen Parasiten des Menschen.* (Les parasites animaux de l'homme), manuel à l'usage des étudiants et des médecins. 2^e édition. Un vol. in-8^o de 283 pages, avec 147 fig. dans le texte. (Wurzbourg, Staden, éditeur, 1895).

La première édition de cet ouvrage date de 1884; c'est dire que le public a su en apprécier la valeur, car, en présence de la multiplicité des publications de ce genre, en Allemagne, il est exceptionnel de voir deux éditions se succéder ainsi en une dizaine d'années.

L'auteur, bien connu pour sa compétence spéciale en parasitologie, a mis son travail au niveau des connaissances les plus récentes.

Après une introduction dans laquelle il traite du parasitisme en général, de l'influence des parasites sur leur hôte, de leur origine et de leur descendance, il arrive à l'étude spéciale des divers parasites animaux de l'homme.

Ceux-ci sont examinés dans l'ordre des classifications zoologiques habituelles, en commençant aux Protozoaires pour aboutir aux Arthropodes.

I. Les Protozoaires sont divisés en trois classes : Rhizopodes, Sporozoaires et Infusoires.

Aux Rhizopodes se rattachent les *Amibes*, dont l'auteur fait une étude assez étendue; il décrit, en effet, avec assez de détails l'*Amoeba coli* et les diverses variétés qui en ont été signalées par Quincke et Roos; puis, les *Amibes* de la cavité buccale; puis l'*Amoeba urogenitalis* Baelz, et quelques autres formes encore peu connues. Nous n'insisterons pas sur ce chapitre, car on sait combien les auteurs varient d'opinion sur la classification et l'influence pathogénique des *Amibes*: témoin les récentes publications de Cilli et Flocca.

En ce qui concerne les Sporozoaires, Braun s'étend un peu longuement sur les Grégaires et les Myxosporidies, qui ne sont pas du domaine de la parasitologie médicale. Il étudie ensuite les *Coccidies*, en admettant chez l'homme les formes que j'ai moi-même considérées dans mon *Traité de zoologie*. — Passant aux *Sarcosporidies*, il signale trois cas, extrêmement douteux, relatifs à l'existence de ces parasites chez l'homme, et un quatrième, tout récent, de Baraban et Saint-Remy, qui semble bien se rapporter à des *Sarcosporidies*. Je ferai seulement remarquer, à ce propos, que les auteurs ont eu tort de classer leur parasite parmi les *Miescheria*; les recherches que j'ai faites sur les *Sarcocystés* de Mouton, par exemple, m'ont démontré qu'un *réactif quelconque* fait disparaître l'apparence striée de la membrane, et lui donne l'aspect d'une cuticule de *Miescheria*; à plus forte raison un liquide conservateur peut-il agir de la sorte. — Braun examine encore les *Microsporidies*, qui doivent, en réalité, se confondre avec les *Myxosporidies*, comme l'a fait voir Thélohan; — il s'arrête enfin aux *Hémosporeidies*, parmi lesquelles il range l'hématozoaire paludique de Laveran (qui appartient aux *Gymnosporidies* de Labbé), et les *Hémosporeidies* vraies des Reptiles et des Batraciens. — Les prétendus Sporozoaires du cancer sont simplement signalés en appendice, et avec les plus expresses réserves.

Dans le groupe des Infusoires, nous n'avons guère à relever, parmi les Flagellés, que les formes connues des *Cercomonadides* ou des *Lamblidés*; aux premières, cependant, il faudrait peut-être rattacher quelques types de Flagellés rencontrés par Kannerberg, Litten, Roos, Streng, dans des cas de pleurésie et de gangrène pulmonaire. — Les Ciliés ne comprennent, en somme, que le *Balantidium coli*, qui n'a pas encore été vu chez l'homme, en France, bien que nous le trouvions abondamment chez le porc.

II. Les *Plathelminthes* sont à leur tour partagés en trois classes : Turbellariés, Trématodes et Cestodes.

Les Trématodes sont classés d'après le système de Monticelli. Comme nouveauté, nous n'avons à y relever que l'introduction, parmi les parasites humains d'un

Distome du chat (*Distomum felinum*) trouvé sur l'homme, en Sibérie, par Vinogradov, — et peut-être faudra-t-il ajouter à cette espèce une seconde du même groupe (*D. truncatum*). — L'histoire de la bilharziose est présentée d'une façon sommaire; notons seulement que l'hôte intermédiaire de la Bilharziose n'est pas encore connu, contrairement à ce qu'avaient fait admettre les observations recueillies en Tunisie par Sinsino.

Nous pouvons aussi passer rapidement sur les Cestodes, quoique l'auteur signale à propos de ce groupe de nombreux faits peu connus en France. — On sait que l'Echinocoque multiloculaire est commun dans l'Allemagne du Sud; quelques auteurs, et en particulier Arthur Müller, ont pensé que cette forme d'Echinocoque était produite par une espèce ou tout au moins une variété particulière de *Tania Echinococcus* (var. *multilocularis*); cette question ne semble pas encore résolue d'une façon bien précise. — L'histoire du Bothriocéphale large est tracée de main de maître : c'est, en effet, Braun qui a, le premier, démontré que l'homme contracte le Bothriocéphale en mangeant certains poissons.

III. Les Nématodes, les Acanthocéphales et les Hirudiniées, qui comprennent un si grand nombre de formes parasitaires, ne peuvent naturellement être passés en revue d'une façon complète. Du reste, à part le *Gnathostomum siamense* et les variétés de Filaires de Manson, déjà signalées dans les ouvrages français, on ne trouve de points nouveaux que dans les détails relatifs aux parasites de ces groupes.

IV. Les Arthropodes terminent l'ouvrage; l'auteur envisage successivement les Arachnides (Acariens et Linguatulides) et les Insectes (Hémiptères, Coléoptères et Diptères). Ce chapitre est un peu écourté, ce qui est la règle dans les ouvrages de parasitologie, les naturalistes abandonnant volontiers l'étude des parasites externes aux dermatologistes, qui, pour la plupart agissent de même à leur endroit.

En résumé, le livre que vient de publier Max Braun représente une œuvre de valeur bien exactement mise au point, et destinée à rendre les plus grands services au public médical.

A. RAILLET.

Professeur à l'École d'Alfort.

E. Dupuy. — *Cours de pharmacie.* Tome II, 2^e fascicule. Médicaments cliniques appartenant à la chimie organique. (L. BAUTAILLE et Cie, éditeurs).

Dans ce deuxième fascicule du tome II, qui termine l'ouvrage, l'auteur passe en revue les nombreux composés du carbone usités en pharmacie; il a adopté pour cette étude l'ordre des fonctions chimiques, qui a l'avantage de rapprocher des corps semblables, non seulement par leurs propriétés chimiques, mais souvent aussi par leurs applications thérapeutiques.

Ce cours est, comme les volumes précédents, exposé avec beaucoup de clarté; pour chaque corps, indépendamment de la préparation, des propriétés physiques et chimiques, des caractères analytiques, propres à reconnaître sa pureté et les falsifications dont il est l'objet, ce qui intéresse surtout le pharmacien, M. Dupuy, s'adressant au médecin, indique l'action physiologique et thérapeutique, la toxicité, le mode d'administration et les doses, enfin les principales formules dont il est la base.

Ainsi se trouvent réunies dans un même ouvrage la théorie et la pratique, celle-ci représentée par un formulaire très complet, comprenant les nombreux corps qui ont enrichi dans ces dernières années notre arsenal thérapeutique.

Ce volume est terminé par un appendice consacré à l'étude des pansements chirurgicaux, de leur préparation, de leur conservation, de l'essai de ces diverses matières. Cette partie de l'ouvrage rendra de très grands services au praticien, parce qu'elle condense en quelques chapitres des notes éparses dans de nombreuses publications, qu'il était obligé jusqu'ici de rechercher. Elle vient bien à son heure, alors que le supplément du Codex, récemment paru, mentionne ces préparations.

F. BOSQUET.

Maragliano. — *La tubercolosi.* Periodico bimensile. Anno III (VALLARDI, éd., Milano 1895).

Cette revue, fondée avec le concours de Cantani, va être continuée par Maragliano; elle analyse avec soin les principaux travaux qui ont trait à la tuberculose, et renferme de plus des articles originaux.

Les fascicules que nous venons de recevoir renferment deux mémoires, l'un de Lipari et Locato, l'autre de Léon Revillo. Le premier de ces travaux ne fait que confirmer une opinion généralement admise par les bactériologues; les auteurs ont reconnu, en effet, qu'il n'y a pas de bacille de Koch dans le sang des phtisiques ou des animaux rendus tuberculeux; dans le dernier cas, si on injecte les cultures dans les veines, les bacilles ne tardent pas à quitter le sang et à aller se déposer dans les organes.

Le travail de Revillo est destiné à mettre en évidence les rapports qui existent entre la tuberculose et la diphtérie. L'auteur essaye d'établir d'abord que la diphtérie est une maladie familiale; il ne s'agit pas, bien entendu, de la contagion; on verrait être certaines familles une prédisposition à contracter la diphtérie et, ce qui le prouve, c'est que la maladie peut venir simultanément et successivement chez des parents qui ne cohabitent pas. L'auteur appuie son opinion sur 21 observations nouvelles, qui peuvent être rapprochées des 14 qu'il a publiées autrefois à la Société médicale des hôpitaux de Paris (1876). La thèse qu'il soutient a déjà rallié des médecins éminents et cadre parfaitement avec ce qu'on observe dans les autres infections. Mais ce qui est plus curieux, c'est que les familles de diphtériques sont en même temps des familles de tuberculeux. Sur les observations étudiées par l'auteur, on trouve que 13 fois la tuberculose et la diphtérie ont coexisté chez le même sujet et que 42 fois, il y avait des parents ou des collatéraux atteints de tuberculose : les deux maladies ont coexisté dans la proportion de 21 pour 100. Revillo est ainsi conduit à conclure que le même terrain est favorable au développement des deux bacilles.

H. ROGER.

CHLORAL BROMURÉ DUBOIS

Sirop prescrit à la dose de 3 à 6 cuillerées, selon l'âge, dans les 24 heures
MALADIES NERVEUSES, INSOMNIES, VERTIGES, ETC., COQUELUCHE
Paris, 20, Place des Vosges et TOUTES PHARMACIES.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Les matières premières qui concourent à la préparation de cet Elixir sont : la viande crue, l'eau-de-vie et les écorces d'oranges amères. Aux malades qui ne peuvent vaincre leur répugnance pour les aliments, aux Phthisiques, aux Anémiques, aux Cancéreux, il réussit constamment.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, place des Vosges et Pharmacies.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES, SCROFULES, RACHITISME

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE
Par cuillerée à potage, 10 centigrammes de créosote de hêtre et 50 centigr. de sel de chaux.
LA MIEUX TOLÉRÉE des PRÉPARATIONS CRÉOSOTÉES
Anticatarrhale et Antiseptique, elle tarit rapidement les sécrétions anormales des bronches et des poumons et cicatrise les lésions tuberculeuses.

Eupeptique et Reconstituante, elle relève promptement les fonctions de nutrition et l'état général.
L. PAUTAUBERGE, 22, rue Jules-César, Paris et PHARMACIES.

BROMIDIA

HYPNOTIQUE
ANTINÉVRALGIQUE

Bien qu'opposé à l'usage de spécialités pharmaceutiques, je fus frappé de la formule de votre **BROMIDIA**, et connaissant l'action des ingrédients qui la composent, je ne pouvais me résoudre à croire que la combinaison aurait un plus grand pouvoir que les composants. Cependant, je me soumis à l'essayer dans un cas obstiné de Névralgie mammaire qui avait été réfractaire à une infinité d'autres médicaments. Le résultat fut brillant et dépassa de beaucoup mon attente.

Je fis alors des expériences avec une préparation faite, selon la formule du **BROMIDIA**, par un pharmacien expérimenté, mais les résultats furent incomparablement inférieurs à ceux que donne votre produit. Est-ce à cause de la plus grande pureté de vos drogues ou d'un mode spécial de combinaison?

Je vous remercie, au nom de l'humanité souffrante, et je demeure, bien à vous.
Barrafranca, Italie, 20 juillet 1893. Dr. ORAZIO SATARIANO.

AVIS IMPORTANT. — Se défier des nombreuses imitations vendues sous le nom de **BROMIDIA**. Prière à MM. les médecins de bien spécifier la marque **BATTLE'S BROMIDIA**

DÉPOT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE ET LES COLONIES :
ROBERTS et Co, pharmaciens-droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS
Prix : 5 fr. — Brochure et échantillons envoyés à MM. les Médecins sur demande — Prix : 5 fr.

Solution — Poudre titrée — Cachets de

CREOSAL DUBOIS

Le **Créosal** est le nom d'une série de préparations titrées à base de tannate de créosote (composé nouveau qui renferme 60 % de créosote et 40 % de tannin) dont on a modifié la saveur et corrigé l'extrême astringence; bien toléré à doses massives. — Diluer dans l'eau la solution et la poudre.

DOSES. — ADULTES : 4 à 6 cuillerées ou cachets par jour. — ENFANTS : 1 cuillerée à café par année d'âge dans une journée.

NOTA. — Le Créosal étant précipité de ses solutions par presque toutes les substances étrangères, on ne doit jamais l'associer à d'autres médicaments.

Le Créosal a donné d'excellents résultats dans les


TUBERCULOSES, BRONCHITES, etc.

PARIS, 56, quai Jemmapes et toutes les Pharmacies.

DRAGÉES DE DUROZIEZ AU PROTOXALATE DE FER

Chaque Dragée contient 10 centigrammes de Protoxalate de Fer. — Une à deux Dragées au début des deux principaux repas.

3 fr. LE FLACON
Pharmacie DUROZIEZ
58, Boulevard Saint-Michel, PARIS.



LAMPE FORMOGÈNE

à dégagement
de Vapeurs d'Aldéhyde formique (FORMOL)
POUR LA

DÉSINFECTION

complète, simple, rapide et économique
DE TOUTS LES APPARTEMENTS, CHAMBRES
DE MALADES, SALLES D'HOPITAUX, ECOLES, etc.

Cet Appareil fonctionne par l'alcool de bois que l'on trouve couramment dans le commerce et dont le prix est insignifiant.

La DÉSINFECTION par ce procédé n'entraîne à aucun déménagement, ne détériore aucun objet et ne laissant pas trace d'odeur.

VENTE EN GROS :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE de PRODUITS PHARMACEUTIQUES
9 et 11, Rue de la Perle, Paris
qui enverra une Notice explicative sur demande.

STATION CLIMATERIQUE DE VERNET-LES-BAINS

(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

SANATORIUM DU CANIGOU

Pour les maladies de poitrine

Dirigé par le D^r CH. SABOURIN

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Une cuiller à Café
PEPSI-MALTOSE DURAND
ANOREXIE
TYPHILITE
Dyspepsies, Gastralgies

38, Rue Boileau, 38
PARIS

après chaque Repas.
Une cuiller à Café
MALTOSE DURAND
ENTÉRITE
TUBERCULOSE

LITHIASE RÉNALE * GOUTTE Aiguë et Chronique * COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE MIDY

INOFFENSIVE, ne se décomposant point dans l'organisme.

Dose à 0,20 par mesure; dose selon le cas, 3 à 8 mesures par jour. Chaque mesure dissoute dans un 1/2 verre d'eau, donne une boisson gazeuse agréable à prendre.

La **PIPÉRAZINE** se combine à l'Acide urique en donnant un urate soluble dans 47 fois son poids d'eau; c'est le sel d'Acide urique le plus soluble, car l'urate de Lithine exige encore 368 parties d'eau pour se dissoudre, c'est-à-dire près de 8 fois davantage.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCS.
Gros : PHARMACIE MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

GLYCÉROPHOSPHATES

Phosphate vital

de JACQUEMAIRE

Identique à celui de l'organisme. Entièrement assimilable, à base de CHAUX, de SOUDE ou de FER.
Indiqué dans : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ALBUMINURIE, PTISIE, ANÉMIE, Maladies des ENFANTS, CONVALESCENCES, etc.
SEUL EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS
L. JACQUEMAIRE, Pharmacien de 1^{re} Classe, à VILLEFRANCHE (Rhône) et toutes Pharmacies.